

Piano regionale della prevenzione 2020-2025-PP5-Sicurezza negli ambienti di vita



Prevenzione degli avvelenamenti in età pediatrica

INGESTIONE DI FARMACI: l'87% delle intossicazioni da farmaci nell'età pediatrica si realizza nell'ambiente domestico e più di 1/3 in cucina, i bambini più a rischio sono di età compresa tra 1 e 5 anni mentre al disotto dell'anno di vita le intossicazioni sono dovute perlopiù ad un uso errato dei farmaci da parte dei genitori



sintomi a cui un genitore deve prestare attenzione in caso di ingestione o sospetta ingestione di farmaci:

- alterazioni del ritmo del respiro e del battito cardiaco
- sudorazione abbondante
- dolore addominale, nausea, vomito , diarrea
- alterazione dello stato di coscienza
- attacco convulsivo



Alcune semplici regole per prevenire questi incidenti : non trasferire i farmaci dalle loro confezioni originali , non manomettere le chiusure di sicurezza delle confezioni , chiamare i farmaci con il loro nome non in modi fantasiosi quali caramelle o pozioni magiche che potrebbero invogliare i bambini ad assumerli tenere i farmaci fuori dalla portata dei bambini



Ingestione di detersivi e altri prodotti chimici per la pulizia della casa:

le intossicazioni per ingestione di detersivi e altri prodotti chimici per la pulizia della casa rappresentano più del 50% dei casi di avvelenamento in età pediatrica

Sintomi cui un genitore deve prestare attenzione in caso di ingestione o sospetta ingestione di detersivi o altri prodotti chimici per la pulizia della casa :

vomito, diarrea , dolore addominale, ipersalivazione tosse, difficoltà respiratoria bruciore alla bocca

Alcune semplici regole per prevenire le intossicazioni da detersivi e altri prodotti chimici per la pulizia della casa:

- evita di travasare detersivi dalle confezioni originali in altri contenitori di bevande o alimenti
- non usare il sotto-lavello per conservare i detersivi ed altri prodotti chimici per la pulizia della casa

Cosa fare in caso di ingestione o sospetta ingestione di farmaci, detersivi e altri prodotti chimici per la pulizia della casa : chiamare immediatamente il Pediatra/Pronto Soccorso Pediatrico/112 tenendo a portata di mano la confezione del farmaco o l'etichett a del prodotto per la pulizia della casa

Cosa NON fare:

1) non indurre il vomito,
2) non improvvisare rimedi casalinghi,
3) non far mangiare il bambino dopo un'intossicazione

